

Fot. 1
Północno-zachodnia część powierzchni
w okolicy m. Podlasek Mały



Fot. 2
Uprawy zbóż na wschód od Krotoszyzna



Fot. 3
Centralna część powierzchni
na północ od Biskupca Pom.



Fot. 4
Wielkoobszarowe pola uprawne
na północ od Piotrowic



Fot. 5
Pola uprawne na północny zachód
od Piotrowic



Fot. 6
Pola uprawne na północ
od Szwarcenowa



Fot. 7
Uprawy zbóż na północ od Szwarcenowa



Fot. 8
Jezioro Trupel



Fot. 9
Jezioro Trupel



Fot. 10
Punkt obserwacyjny badań awifauny



Fot. 11
Liczenie ptaków na jeziorze Popówko



Fot. 12
Stado gęsi żerujących na resztkach
poźniwnych - pola kukurydzy na północ
od Czachówek



Fot. 13
Stado gęsi żerujących na resztkach
poźniwnych - pola kukurydzy na północ
od Czachówek



Fot. 14
Stado czajek żerujących na polach
w okolicy Czachówek



Fot. 15
Kolonja brzegówek w wyrobisku żwiru
przy drodze na południe od Piotrowic



Fot. 16.
Krajobraz powierzchni badawczej
"Szwarcenowo". Okazałe grusze przy
polnej drodze.




Fot. 17
Krajobraz rolniczy, powierzchnia
"Biskupiec"




Fot. 18
Grąd subkontynentalny *Tilio-Carpinetum*
na zboczu doliny rzeki Osy, stanowisko
konwalii majowej (*Convallaria majalis*).
Powierzchnia "Biskupiec"



Fot. 19
Chroniona aleja przy drodze powiatowej
1279N przebiegającej przez
powierzchnie "Piotrowice" i "Biskupiec"



Fot. 20
Ols ze stanowiskami kilku gatunków
chronionych roślin. Powierzchnia
"Piotrowice"



Fot. 21
Kukułka szerokolistna (*Dacylorhiza
majalis*) stanowisko w południowym
krańcu powierzchni "Piotrowice"



Fot. 22
Daniel (*Dama dama*)



Fot. 23
Sarna - kozioł (*Capreolus capreolus*)



Fot. 24
Dzik (*Sus scrofa*)



Fot. 25
Dostojka latonia (*Issoria lathonia* (L.)) masowo występujący w lipcu motyl siedlisk ruderalnych



Fot. 26
Kopulujące w szuwarach bielinki rzepniki (*Pieris rapae* (L.)).
Pospolity motyl środowisk otwartych



Fot. 27
Szlaczkoń siarecznik (*Colias hyale* L.)
pospolity gatunek szuwarów i łąk.



Fot. 28
Wśród zarośli wierzbowych, na powierzchni Piotrowice, występuje okazały przedstawiciel kózkowatych:
wonnica piżmówka